



ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ/ਟਾਇਲੇਨੋਲ

6 ਸੁਝਾਅ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ *



ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਭ
ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।



ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।



ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ
4-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ।



ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।



ਦੋਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਚਣ
ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਰੋ।



ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ
ਪਾਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼
ਕਰੋ।

*ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।